感染症広域情報:サル痘の発生状況 (サル痘を風土病としない複数国での新規発生)

- ●5月21日、世界保健機関(WHO)は、計12か国からサル痘ウイルスの症例が報告されている旨発表しました。WHOは今後更に非流行国にも症例が拡大する見込みとの見解を示しています。
- ●現在有効な予防法としては、症状のある者やサル痘を有する可能性のあるげっ歯類等のほ乳類との接触を避け、石けんやアルコールベースの消毒剤を使用した手指衛生を行うことが推奨されています。
- ●今般、新たにサル痘ウイルスが発生した12か国(豪州、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、英国、米国)に渡航される方は、特に感染予防にご留意ください。なお、それ以外の国・地域に渡航される方についても、今後渡航先において感染が拡大する可能性が否定されないところ、感染予防にご留意願います。

1 サル痘の発生状況

世界保健機構(WHO)は、5月21日、サル痘ウイルスを風土病としない 12か国から、92例の陽性確定、および28例の疑いがあり、現在調査中で ある旨発表しました。WHOでは更なる調査を進めており、感染拡大防止のた め、近日中により詳細な推奨方針を公表する予定です。

〇5月21日付WHOによる発表(英文)

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON385

2 サル痘について

(1) 概要

サル痘はリスなどのげっ歯類が自然宿主として考えられ、天然痘同様の症状を伴う急性発疹性疾患です。従来、アフリカに発生する風土病であり、2021年12月から2022年5月までにカメルーン(25例陽性、うち5例死亡)、中央アフリカ(6例陽性、うち5例死亡)、コンゴ(民)民主国共和国(1238例陽性、57例死亡)、ナイジェリア(48例陽性、死亡例0)が報告されています。

(2)症状

潜伏期間は5~21日(通常は6~13日)、致死率は数%~10%と報告されています。初期症状は、発熱、悪寒、背中の痛み、筋肉痛、リンパ節の腫れ等

であり、発熱後1~3日で特徴的な発疹が顔や四肢に現れ、口の中や性器、目に も発疹が現れることがあります。臨床的には天然痘と区別が困難です。

(3) 予防法

サル痘の流行地では以下のような感染予防対策を心がけ、感染が疑われる場合には、直ちに医師の診察を受けてください。

- ●症状のある人の飛沫・体液等との接触を避ける。
- ●サル痘を保有する可能性のあるげっ歯類等のほ乳類(死体を含む。)との接触を避け、野生の狩猟肉(ブッシュミート)を食べたり扱ったりすることを控える。
- ●石けんと水、またはアルコールベースの消毒剤を使用した手指衛生を行う。 (参考)

〇厚生労働省検疫所

https://www.forth.go.jp/news/20220521_00001.html

〇国立感染症研究所

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/408-monkeypox-intro.html

3 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

海外渡航前には、万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え、必ず在留届を提出してください。

(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)

また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。

(詳細は https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

(問い合わせ窓口)

〇外務省領事サービスセンター

住所:東京都千代田区霞が関 2-2-1

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)

〇外務省領事局政策課(海外医療情報)

電話:(代表) 03-3580-3311(内線) 4919

〇外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/

(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp

(現地在外公館連絡先)

各国の在外公館は以下の外務省ホームページをご参照ください。

〇外務省ホームページ: 在外公館リスト

https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html